



Токсикомания — это вдыхание летучих наркотических веществ.

Токсикомания является одним из видов наркомании и вызывает зависимость и серьёзные нарушения в организме человека.

При токсикомании у человека возникает стабильная эйфория, через короткий промежуток времени сознание мутнеет, человек теряет ориентацию, начинается тошнота.

Сильные токсические вещества способны вызывать бред и галлюцинации, потерю самоконтроля, нарушение мышления.

При очень больших дозах могут появиться судороги, человек может впасть в кому или же умереть.

Токсикоманы используют поддельные вывески пакеты для выдыхания бензина, хлороформа, толдотона, летучих растворителей, ацетона, эфира, керосина, этиленгликоля, пипноновыдыхателей, синтетических клеев, нитрокраясок, яков, дезодорантов и т.д.

Все эти вещества токсичны для организма человека.



Тричины

✓ Желание стать взрослыми, самостоятельными и независимыми от родителей побуждает подростков делать поступки, которые ими запрещаются, либо вызывают недовольство.

✓ Сильное любопытство, желание испытать новые ощущения, стремление не отставать от своих сверстников. Прием «за компанию».

✓ Изобилие свободного времени, незнание и неумение себя чем-либо занять приводит подростков к скуке. Из-за этого подростки вынуждены проводить своё время в уличных компаниях, где в основном и возникают первые попытки токсикомании.

✓ Несостоятельность в учёбе и связанные с ней прогулы от нежелания учиться, быть посмешищем в классе.

✓ В 70% - это дети из неблагополучных семей, и семей, в которых применяется либеральный стиль воспитания. В таких семьях жизнь подростков никак не контролируется, она пушена на самотёк.



Как определить токсикомана?

Определить токсикомана можно по впадшим и красным глазам, не проходящему насморку, бронхиту.

Внешне наблюдается покраснение лица и серый цвет носогубного треугольника. Зрачки подростка расширены, руки дрожат, походка становится шаткой, нарушается координация движений.

В каком возрасте дети становятся токсикоманами?

В большинстве случаев токсикомания развивается в младшем или среднем подростковом возрасте (12-14 лет), иногда даже еще в 9-11 лет.

Впоследствии большая часть подростков прекращают ингаляции. Некоторые из них переходят к злоупотреблению алкоголем или другими токсическими веществами.

Чаше всего токсикомания бывает групповой. Размеры группы различны - от 2-3 подростков до почти всего школьного класса или почти всех сверстников одного дома. Группа формируется по месту жительства (например, многоквартирный дом, микрорайон в городе) или по месту учёбы.

ВНИМАНИЕ!

Родители!



Более внимательно присмотритесь к поведению, образу жизни, друзьям, времяпрепровождению ребёнка.

Возможно, пока ещё речь идёт об этапе отклоняющегося поведения, но и в этом случае предупредить такого поведения и образа жизни послужит профилактике токсикомании, и как следствие возможных противоправных действий.